



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ
ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО:
ПЛАЧ И ИСТЕРОИДНАЯ РЕАКЦИЯ

УЧЕБНЫЕ СЛАЙДЫ К ИНСТРУКТАЖУ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: ПЛАЧ И ИСТЕРОИДНАЯ РЕАКЦИЯ

ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАЧЕ

1. НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ОДНОГО
2. ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ
3. ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОВЕТОВ
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО





ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: ПЛАЧ И ИСТЕРОИДНАЯ РЕАКЦИЯ

ПРИЗНАКИ ИСТЕРИКИ

- ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
- МНОЖЕСТВО ДВИЖЕНИЙ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОЗЫ
- ЭМОЦИОНАЛЬНО НАСЫЩЕННАЯ, БЫСТРАЯ РЕЧЬ
- КРИКИ, РЫДАНИЯ



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: ПЛАЧ И ИСТЕРОИДНАЯ РЕАКЦИЯ

ПОМОЩЬ ПРИ ИСТЕРИКЕ

1. ОТВЕСТИ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
2. ЗАМКНУТЬ ЕГО ВНИМАНИЕ НА СЕБЕ
3. НЕ ВСТУПАТЬ В АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ, СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО

